

Cadre de délivrance et de prescription de la buprénorphine

Le traitement peut être **initié en médecine de ville**.

Avant la première prise, il est recommandé d'attendre pour cela l'apparition des premiers signes de manque. La dose efficace doit être atteinte rapidement dans la première semaine.

La **voie sublinguale** est la seule efficace. La voie orale rend la buprénorphine quasiment inefficace ne laissant passer qu'une faible fraction dans la circulation systémique du fait d'un important effet de premier passage. Le comprimé doit donc être laissé **sous la langue de 5 à 10 minutes**, sans l'avaler ni le sucer, jusqu'à dissolution complète.

- La **prescription** est de **28 jours maximum**.
- La **délivrance** quotidienne, hebdomadaire (conseillée) ou bimensuelle selon les indications du prescripteur.

Précautions d'emploi :

- Une des premières causes de mésusage est le sous dosage et le fractionnement des prises
- Risque de mésusage avec injection IV avec complications oedémateuses et ischémiques locales (syndrome de Popeye), infectieuses et contaminations VIH, VHC ou VHB.
- Peu de risque de dépression respiratoire grave sauf en cas d'association avec des benzodiazépines, des hypnotiques ou de l'alcool.
- Concentration sérique augmentée (effet inhibiteur du CYP3A4) avec le kétonazole, itraconazole et les inhibiteurs de la protéase du VIH.

Spécificités de la Buprénorphine/naloxone

La combinaison buprénorphine naloxone est disponible en France depuis janvier 2012.

L'apport de la naloxone a pour effet de limiter l'usage détourné du traitement, par injection ou par sniff.

En effet, prise par voie sublinguale, la buprénorphine/naloxone présente les mêmes effets que la buprénorphine seule, la naloxone, de faible biodisponibilité sublinguale (3%), étant quasi totalement métabolisée par le premier passage hépatique.

Administrée par voie intraveineuse ou sniffée, la Suboxone® provoque un syndrome de sevrage opiacé e tdonc pas d'effet renforçant positif (effet plaisir)

Le cadre de prescription et de délivrance ainsi que les précautions d'emploi sont les mêmes que pour la buprénorphine

Le passage d'un traitement buprénorphine à un traitement Suboxone® peut se faire directement, à posologie équivalente.